

Vaccin in het kort voor het **DTP-vaccin**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Een ziekte met ernstige ontstekingen van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Een ziekte die kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.
- **Polio.** Een ziekte die kan zorgen voor een verlamming van de armen of benen.

De ziektes difterie, tetanus en polio zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van uw kind het virus dat polio veroorzaakt. Ook herkent het lichaam de bacteriën die de ziektes difterie en tetanus veroorzaken.

Komt uw kind na de vaccinatie in contact met het virus of de bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die uw kind beschermen.

Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.

Als uw kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma volgt is dit vaccin een **herhaling**. Uw kind heeft op jongere leeftijd al vaccinaties gehad tegen difterie, tetanus en polio. Na deze herhalingsprik is uw kind langer beschermd tegen deze ziektes.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

Is uw kind in 2016 of na 2016 geboren? Dan krijgt uw kind deze prik in het jaar dat uw kind 14 wordt.

Is uw kind in 2015 of voor 2015 geboren? Dan heeft uw kind deze prik al gekregen op de leeftijd van 9 jaar.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in het bovenbeen of de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zeker worden. Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft uw kind een **lichte infectie**, zoals een verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Uw kind is na deze laatste vaccinatie van de serie D(K)TP in het Rijksvaccinatieprogramma minimaal 10 jaar beschermd tegen tetanus.

Heeft uw kind na die tijd een wond die vuil is? Met vuil van de straat of bijvoorbeeld nadat uw kind door een dier is gebeten? Neem dan contact op met uw arts. Uw kind heeft dan misschien een nieuwe vaccinatie nodig.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, tetanus en polio.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Een verharde huid of een knobbeltje op de plek van de prik.

Ongeveer 1 op de 100 kinderen krijgt last van:

- Koorts, hoofdpijn of duizelig zijn.
- Misselijk zijn, soms met overgeven.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over het vaccineren van uw kind? Bespreek deze dan met de jeugdarts, uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiters op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl).

Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl).

Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).