

Vaccin in het kort voor het **DKT-vaccin voor kinderen**

Waarvoor is dit vaccin?

Dit vaccin beschermt uw kind tegen verschillende ziektes:

- **Difterie.** Een ziekte met ernstige ontstekingen van de keel, het hart, de nieren of zenuwen. Klachten zijn onder andere keelpijn en moeite hebben met ademen.
- **Kinkhoest.** Een ziekte met ontstekingen van de neus, keel en longen. Klachten zijn onder andere veel hoesten en moeite hebben met ademen.
- **Tetanus.** Een ziekte die kan zorgen voor erge, pijnlijke kramp in de spieren en moeite met slikken en ademen.

De ziektes difterie, kinkhoest en tetanus zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin?



Na de vaccinatie herkent het lichaam van uw kind de bacteriën die de ziektes difterie, kinkhoest en tetanus veroorzaken.

Komt uw kind na de vaccinatie in aanraking met de bacteriën die zorgen voor deze ziektes? Dan kan het lichaam snel antistoffen aanmaken die uw kind beschermen.

Hierdoor wordt uw kind niet ziek of veel minder ziek.

Als uw kind het volledige Rijksvaccinatieprogramma volgt is dit vaccin een **herhaling**. Uw kind heeft als baby al vaccinaties gehad tegen difterie, kinkhoest en tetanus. Na deze herhalingsprik is uw kind langer beschermd tegen deze ziektes.

Wanneer krijgt mijn kind dit vaccin?

In het schema van het Rijksvaccinatieprogramma krijgt uw kind deze vaccinatie op de leeftijd van 5 jaar.

Het kan zijn dat uw kind een aangepast schema krijgt. Volg altijd het schema van uw kind.



Uw kind krijgt de prik in de bovenarm.

Deze vaccinatie is onderdeel van het **Rijksvaccinatieprogramma**. Dit is een programma van de overheid om mensen te beschermen tegen besmettelijke ziektes. De vaccinaties die onderdeel zijn van het Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Wat moet ik doen als mijn kind de vaccinatie niet heeft gehad?



Heeft uw kind de afspraak voor de vaccinatie **gemist**? Maak zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Belangrijkste waarschuwingen



Heeft uw kind **koorts** voordat het de vaccinatie krijgt? Uw kind kan dan nog zieker worden. Advies RIVM: Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie als uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft.



Heeft uw kind een **lichte infectie**, zoals een verkoudheid? Overleg met uw arts of u een nieuwe afspraak moet maken voor de vaccinatie.

Belangrijkste bijwerkingen

Net zoals bij andere vaccins kan uw kind last krijgen van bijwerkingen. Dit komt omdat het vaccin ervoor zorgt dat de afweer van uw kind gaat werken. Afweer zorgt voor bescherming tegen difterie, kinkhoest en tetanus.

Ongeveer 1 op de 10 kinderen krijgt last van:

- Pijn, rood of dikker worden van de huid op de plek van de prik.
- Slaperig zijn.
- Moe zijn.
- Prikkelbaar zijn.

Deze bijwerkingen duren meestal 1 of 2 dagen.

Meer weten?

Heeft u vragen of twijfels over het vaccineren van uw kind? Bespreek deze dan met de jeugdarts, uw arts of apotheker.

Kijk voor de officiële bijsluiter op [geneesmiddeleninformatiebank.nl](https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl). Of kijk voor meer informatie op [apotheek.nl](https://www.apotheek.nl), [thuisarts.nl](https://www.thuisarts.nl) of [rijksvaccinatieprogramma.nl](https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl). Wilt u een bijwerking melden of hier meer over weten? Dit kan op [lareb.nl](https://www.lareb.nl).